

CONSENTIMIENTO INFORMADO PIERCING

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES DE 16 AÑOS Y/O PERSONAS INCAPACITADAS.
(Datos a llenar por el representante legal)

Nombre y apellidos _____ Fecha de nacimiento _____ DNI _____
En calidad de: Padre, Madre, Representante legal, habiendo sido también informado, acredito que el usuario/a presenta la madurez suficiente para dar el consentimiento a que le sea realizado este piercing.

Data _____ Firma _____ (Adjuntar fotocopias: DNI, libro de familia o acreditación de representante legal)

Todos los datos de esta hoja se guardarán en un fichero sometido a la ley de protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre). El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, modificación, cancelación, y oposición de estos datos.

INFORMACIÓN ANEJA PARA EL USUARIO

El **piercing** consiste en perforar la piel, las mucosas u otros tejidos con el fin de colocar joyas u otros objetos de metal. El conocimiento de los riesgos y la aceptación previa a la práctica a realizar puede evitar sufrimientos innecesarios al usuario.

Contraindicaciones

- **No se podrá realizar bajo ninguna circunstancia**

En caso de tener alergias conocidas a los metales que forman parte del piercing.
Cuando la zona donde se quiere hacer el piercing tiene afecciones de la piel como pecas, manchas, verrugas, o lesiones cutáneas no diagnosticadas.
Si sufre alguna enfermedad de la piel como *psoriasis, urticaria, etc.

- **Será necesario un informe médico**

En caso de sufrir algunas infecciones o enfermedades como diabetes, afecciones cardíacas o renales, hepatitis, VIH, etc., puesto que disminuyen las defensas y las complicaciones pueden ser más graves.
Si se sufren enfermedades de la sangre o si se está haciendo un tratamiento anticoagulante con *acenocumarol (*Sintrom ®), puesto que se pueden tener hemorragias.
Si recientemente se ha sufrido un tratamiento para el acné con *isotretinoína (*Isoacné ®, *Dercutane ®, *Acnemin ®, etc.), dado que son tratamientos que modifican la piel y las mucosas, y se podría sangrar con más facilidad.
Si se tiene epilepsia puesto que podría desencadenarse un ataque.
Si se sufren trastornos psicológicos o de la personalidad.

- **De forma temporal**

En caso de sufrir alguna afectación aguda como pueden ser las infecciones locales por verrugas víricas, herpes simple o infecciones bacterianas. Es necesario esperar que el proceso patológico se resuelva.

Si ha tenido muy recientemente infiltraciones médico estéticas, intervenciones quirúrgicas, quimioterapia o radioterapia, o tiene cicatrices no estabilizadas, quemaduras recientes, úlceras o hematomas. En estos casos habrá que esperar que la debilidad inmunológica se estabilice. Situaciones fisiológicas como el embarazo o la lactancia. Son circunstancias en las que es difícil el tratamiento de las posibles complicaciones por el peligro de transmisión de los agentes que pueden causar efectos no deseables al bebé.

Riesgos sanitarios

- Enfermedades de transmisión sanguínea como hepatitis, tétanos, sida. Pueden ser contagiadas a través del instrumental con el que se realiza el piercing si no se tiene cura de una buena práctica higiénica y no se cumple la normativa establecida (material esterilizado, empaquetado individualmente y desechable).
- Infecciones locales bacterianas, víricas o fúngicas. Si se realizan prácticas poco asépticas, o no se hacen bien las curas durante el proceso de cicatrización.
- Alergias que el usuario desconoce que sufre. El contenido de níquel en el acero quirúrgico 316L es elevado y puede dar problemas alérgicos, así como el níquel contenido en otras aleaciones.
- Alergias al látex de los guantes del aplicador o a los anestésicos.
- Reactivación de herpes simple o de herpes zóster.
- Mala cicatrización o cicatrices hipertróficas e incluso queloides.

Riesgos y complicaciones según la zona de implantación

- En el pezón de los hombres se puede producir un aumento del tamaño; en las mujeres se pueden obstruir los conductos galactóforos y alterar el sistema endocrino induciendo a la secreción de leche; en los adolescentes puede ocasionar problemas durante el crecimiento.
- En las embarazadas habrá que retirar el piercing de la zona umbilical y del pezón para evitar el rechazo, debido a la distensión abdominal y a la modificación del pecho.
- En ombligos prominentes. En caso de infección podría propagarse a órganos intraabdominales
- En zonas donde hay cartílagos, sobre todo en la oreja, pueden desarrollarse fácilmente infecciones que lleven a la necrosis.
- En zonas mucho *vascularizadas como la lengua, es frecuente que se produzcan hemorragias.
- En el área genitourinaria (pene, clítoris,...) las complicaciones más frecuentes son la mala cicatrización y la hemorragia persistente, así como las infecciones genitourinarias de repetición.

Informaciones previas a la práctica

- La época del año menos adecuado para hacerse un piercing es el verano, por el sudor y las prácticas asociadas de playa, piscina y exposición al sol o a los rayos *uva.
- Pensar bien la zona donde colocar el piercing dado que hay lugares con más o menos riesgos.
- En caso de pruebas diagnósticas, como una resonancia magnética, tendrá que hacerlo constar.
- Si es donante de sangre el piercing limitará un tiempo la donación. Igualmente lo tendrá que hacer constar.
- Los días antes de hacerse el piercing se recomienda no consumir drogas, alcohol, medicamentos antiplaquetarios como el ácido acetilsalicílico (aspirina ®, etc.), puesto que estos productos pueden aumentar el riesgo de hemorragia.
- Es preferible no estar en ayunas.

Consejos para el tratamiento de la zona afectada

- Lavarse bien las manos antes de tocar la zona afectada.
- Hacer la higiene diaria con suero fisiológico y aplicado con una gasa estéril.
- Aplicar frío seco (los dos primeros días, máximo 5 minutos consecutivos).

- Mantener la zona seca.
- No agredir: no rascarla, ni frotarla. Si aparece costra no se tiene que rascar ni sacar.
- Evitar cosméticos no específicos: cremas, maquillajes, leches limpiadoras, vaselina, etc.
- Evitar la exposición al sol y a los rayos *uva. En todo caso utilizar protectores solares de pantalla total.
- Hasta que no esté cicatrizado no bañarse en la piscina ni en la playa y no utilizar la sauna.
- Utilizar ropa que no estreche al lugar donde hay el piercing

En caso de sufrir enfermedades o desconocer su historial médico tiene que consultar el médico. Si durante el proceso de puesto tratamiento apareciera cualquier reacción o alteración tiene que consultar el médico.

Sin el consentimiento informado y el justificante médico, si es necesario, no se puede realizar el piercing.

Data _____

Firma del usuario/a

Firma del aplicador/a